



*Rosa indica stelligera.*

*P. B. Boiss.*

*Le Bengale étoilé.*

*Superior de Chénod.*

*Chapoy 1846.*

## LES ROSES.

41

### ROSA INDICA STELLIGERA.<sup>(1)</sup>

*R. germinibus oblongo-ovatis pedunculisque glabris; petiolis aculeatis; petalis bicoloribus, caule subinermi. (N.)*

### LE BENGAL ÉTOILÉ.

#### DESCRIPTION.

Petit arbrisseau qui ne s'élève guère qu'à huit ou dix pouces. Il présente un buisson assez touffu, dont les branches sont, presque toujours, dépourvues d'aiguillons; parfois, cependant, on en trouve un ou deux à la base de ceux des rameaux principaux qui sont le plus rapprochés du sol. Les feuilles se composent de trois ou de cinq folioles arrondies à la base, et pointues au sommet, glabres et d'un vert clair en-dessus, plus pâles et quelquefois couvertes, en partie, d'une teinte rougeâtre en-dessous et sur la bordure: elles sont portées par un pétiole coloré, un peu hispide, garni de quelques aiguillons, ayant à sa base deux stipules, bifides, pointues au sommet, denticulées en leur bord. Les fleurs naissent solitaires à l'extrémité des rameaux. Le tube du calice est ovoïde et glabre; le pédoncule est également glabre. Les divisions du

(1) *Habitus.* FRUTICULUS humilis, circiter pedalis, rarissime aculeatus. FOLIOLA quina, etiam ternia, ovalia, basi rotundata, apice acuta, serrata, serraturis rubro-marginatis, supra latè-viridia, infra pallidiora. PETIOLI rubri, glandulis sessilibus, nonnullisque aculeis praediti. STIPULAE angustae margine glanduloso-ciliatae. PEDUNCULI glabri, solitarii. TUBUS CALYCIS oblongo-oviformis, glaber, aliquando coloratus. LACINIAE CALYCINAE integerrimae, ovato-lanceolatae, apice dilatatae, intus et limbo tomentosae, coloratae. PETALA quinque, obcordata, post antesis, statim, pallide rosea, circiterque a medio usque ad unguem, gradatim albedo-picta; postea, colore purpurascens saturata. FRUCTUS pyriformes, glabri, rubri vel aurantiaci, nitidi. Diutius inhaerent. (N.)